



WELL CHILD EXAM - EARLY CHILDHOOD 18 MONTHS

(Meets EPSDT Guidelines)

DATE

童年早期：18個月

由家長填寫兒童的情況

兒童姓名

兒童由誰帶來

出生日期

過敏症

目前用藥

自上次體檢後出現的病症/事故/問題/擔憂

今天我有一個不明白的問題，關於：

是 否

☐ ☐

我的孩子會自己喂食。

是 否

☐ ☐

我的孩子會招手“再見”。

☐ ☐

我的孩子能講20個詞。

☐ ☐

我的孩子能聽從簡單的教導。

WEIGHT KG/OZ. PERCENTILE

HEIGHT CM/IN. PERCENTILE

HEAD CIR. PERCENTILE

☐ Review of systems ☐ Review of family history

Screening:

N A

Hearing

☐ ☐

Vision

☐ ☐

Development: Circle area of concern

Adaptive/Cognitive

Language/Communication

Gross Motor

Social/Emotional

Fine Motor

Behavior

☐ ☐

Mental Health

☐ ☐

Physical:

N A

General appearance

☐ ☐

Chest

N A

☐ ☐

Skin

☐ ☐

Lungs

☐ ☐

Head

☐ ☐

Cardiovascular/Pulses

☐ ☐

Eyes Cover/Uncover

☐ ☐

Abdomen

☐ ☐

Ears

☐ ☐

Genitalia

☐ ☐

Nose

☐ ☐

Spine

☐ ☐

Oropharynx/Teeth

☐ ☐

Extremities

☐ ☐

Neck

☐ ☐

Neurologic

☐ ☐

Nodes

☐ ☐

Gait

☐ ☐

Describe abnormal findings and comments.

Diet

Elimination

Sleep

☐ Review Immunization Record ☐ Lead Exposure☐ Fluoride Supplements ☐ Fluoride Varnish☐ Hct/Hgb ☐ TB ☐ Dental Referral

Health Education: (Check all discussed/handouts given)

☐ Nutrition/Feeding ☐ Toilet Training ☐ Safety☐ Development ☐ Car Seat or Booster Seat ☐ Teeth Care☐ Passive Smoking ☐ Discipline/Limits ☐ Child Care☐ Bedtime Routine☐ Other:

Assessment/Plan:

IMMUNIZATIONS GIVEN

REFERRALS

NEXT VISIT: 2 YEARS OF AGE

HEALTH PROVIDER NAME

HEALTH PROVIDER SIGNATURE

HEALTH PROVIDER ADDRESS

Guidance to Physicians and Nurse Practitioners for Early Childhood (18 months)

The following highlight EPSDT screens where practitioners often have questions. They are not comprehensive guidelines.

Fluoride Screen

Fluoride supplements should be considered for all children drinking fluoride deficient (<0.6 ppm F) water. Before supplements are prescribed, it is essential to know the fluoride concentration of the patient's drinking water. Once the fluoride level of the water supply has been evaluated, either through contacting the public health officials or water analysis, as well as evaluating other sources of fluoride, the daily dosage schedule can be recommended. Pediatric Dentistry: Reference Manual 1999--00.(21)5.

Tuberculosis Screen

Screen for these risk factors:

- Members of household with tuberculosis or in close contact with those who have the disease.
- Close contact with recent immigrants or refugees from countries in which tuberculosis is common (e.g., Asia, Africa, Central and South America, Pacific Islands); migrant workers; residents of correctional institutions or homeless shelters or persons with certain underlying medical disorders.

Hepatitis B Vaccine

- For children and adolescents not vaccinated against hepatitis B in infancy, begin the hepatitis B vaccine series during any childhood visit. Give the second dose at least one month after the first dose and give the third dose at least four months after the first dose and at least two months after the second dose.

Developmental Milestones

Always ask about and follow-up on parent concerns about development or behavior. You may use the following screening list, or use the Ages and Stages Questionnaire, the Denver II, the ELMS2 (a language screen), or the MacArthur Communication Development Inventory.

Yes No

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <u>Walks backward.</u> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Points to 2 body parts ("show me your nose, eyes," etc.). |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Drinks from a cup. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <u>Imitates household chores such as sweeping.</u> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <u>Uses 20 words.</u> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Understands the meaning of "Get up " or "Sit down." |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Stacks 2 blocks. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <u>Scribbles.</u> |

- Avoids eye contact.
 - Persistent rocking, hand flapping, head banging or toe walking.
 - No single word by 16 months.

Instructions for developmental milestones: At least 90% of children should achieve the underlined milestones by this age. If you have checked "no" on any two items or *even one* of the underlined items, or any of the **boxed items** (abnormal behavior at this age), refer the child for a formal developmental assessment.

Notes: Immunization schedules are from the Advisory Committee on Immunization Practice of the U.S. Centers for Disease Control and Prevention. **Parents and providers may call Healthy Mothers, Healthy Babies (1-800-322-2588) with questions or concerns on childhood development.**



健康兒童體檢 - 童年早期：18個月
WELL CHILD EXAM - EARLY CHILDHOOD: 18 MONTHS
(符合EPSDT早期定期檢查、診斷和治療指南標準)

日期

童年早期：18個月

由家長填寫兒童的情況

兒童姓名	兒童由誰帶來	出生日期
過敏症	目前用藥	
自上次體檢後出現的病症/事故/問題/擔憂		今天我有一個不明白的問題，關於：
是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
我的孩子會自己喂食。		我的孩子會招手“再見”。
我的孩子能講20個詞。		我的孩子能聽從簡單的教導。

體重 千克/盎司 百分比

身高 厘米/英寸 百分比

頭圍 百分比

☐ 系統審核 ☐ 家族健康史審核

檢查： 正常 不正常
聽力檢查 ☐ ☐
視力檢查 ☐ ☐

發育：請勾劃出您感到擔心的方面

適應/ 認知 語言/ 交流溝通
大的肌肉運動 社交/ 情緒 細致的肌肉運動
行為 ☐ ☐
心理健康 ☐ ☐

身體： 正常 不正常 正常 不正常
整體外觀 ☐ ☐ 胸腔 ☐ ☐
皮膚 ☐ ☐ 肺部 ☐ ☐
頭部 ☐ ☐ 心血管/脈搏 ☐ ☐
眼睛（有覆蓋物/ 無覆蓋物） ☐ ☐ 腹部 ☐ ☐
耳朵 ☐ ☐ 生殖器 ☐ ☐
鼻子 ☐ ☐ 脊椎 ☐ ☐
口咽/ 牙齒 ☐ ☐ 四肢 ☐ ☐
頸部 ☐ ☐ 神經 ☐ ☐
淋巴結 ☐ ☐ 步態 ☐ ☐

請說明異常發現，並請加以評論。

飲食

排洩

睡眠

☐ 審核免疫記錄 ☐ 鉛中毒現象
☐ 氟化物藥品 ☐ 氟化物銣劑
☐ Hct/Hgb ☐ TB(肺結核) ☐ 牙科轉介

保健教育：（勾劃所有已討論過/已發過相關資料的項目）

☐ 營養/ 進食 ☐ 大小便訓練 ☐ 安全
☐ 發育 ☐ 兒童車座椅或加固兒童車座 ☐ 牙齒保健
☐ 被動吸煙 ☐ 管教/ 定立規矩 ☐ 托兒
☐ 入睡過程
☐ 其他：

評估/ 計畫：

已完成的免疫接種

轉介

保健服務機構名稱

保健服務機構地址

下次檢查：2歲

保健服務機構簽名

DSHS 13-684 CH (REV. 08/2004)

☐ 參見口述記錄

童年早期：18個月

18個月小寶寶的保健

重要標誌

小寶寶在18至24個月期間的生長發育

能說至少有兩個字的短語。

疊搭五或六塊積木。

踢球和扔球。

使用杯子、勺子和叉子。

聽懂有兩個步驟的指令。

試用蠟筆劃直線和圓圈。

您可以在與您的小寶寶玩耍時幫助她學會新技能。

若需要幫助或詳細資訊，請電

兒童健康與發育、免疫：

健康母親、健康寶寶資訊和轉介專線

1-800-322-2588（留言）或

1-800-833-6388（TTY中繼轉發）

兒童車座椅安全問題：

安全約束裝置聯盟，1-800-BUCK-L-UP

子女教養技巧或支持：

家庭幫助專線

1-800-932-HOPE (4673)

西北地區家庭服務資源

1-888-746-9568當地社區學院課程

保健須知

在小寶寶逐漸長大後，孩子的保健週期間隔時間便會拉長。與醫生或護士商談最佳的保健門診時間。若您在兩次體檢之間發現問題，一定要與他們交談並提出問題。

檢查並確定孩子已接受這個年齡所需的全部免疫服務。若發現有漏掉，應預約門診並儘快補上。他需要所有的免疫服務才能最有效地預防重病。

您孩子的食慾可能不如過去。為他提供各種品種多樣的健康食品。讓他來決定每種食品要吃多少。不要強迫他一定要吃完食物。

孩子每天需要兩杯牛奶或酸奶或者三片奶酪。在2歲前應避免低脂肪食品。

子女教養須知

每個孩子都有自己的發育方式，但您最瞭解您的孩子。若您覺得她的發育不理想，她可以得到一次免費檢查。請給HMHB打電話與您當地的家庭資源協調人員聯繫。

安全須知

摔跤經常會使幼兒受傷。帶孩子到安全的遊樂場玩耍。找一處帶有護墊、沙子或玩具下鋪有刨花的地方。尋找適合小兒玩耍的小玩具。在孩子玩耍時應守在近旁。

您的孩子可能想要從嬰兒車座椅裡出來。不要讓他出來，否則他就會不斷地嘗試。

- 若他試著要出來，您應態度堅決，將車停下，並拒絕移動直到他繫好安全帶並坐穩。
- 在車上備好軟質玩具、圖畫書和音樂來哄他。
- 您自己也應繫好安全帶。